

Copyright Instituto de Psicofarmacología

Esta presentación está protegida por derechos de autor por el Instituto de Psicofarmacología.

Los suscriptores pueden descargarla y utilizarla sólo para uso personal.

La distribución de esta presentación y su contenido, sin permiso, es una violación a los derechos de autor.



Manejo de los síntomas conductuales en demencia (SCPD)

Rajesh Tampi , MD

Professor of Psychiatry



Case Western Reserve University School of Medicine




Prevalencia de síntomas psicológicos y conductuales en demencia (SCPD)



Prevalencia de SPCD




Individuos que viven
en la comunidad:
30%




Residentes en
hogares de ancianos:
80%

Prevalencia de SPCD



Evolución de SPCD



Síntomas comunes del SPCD: apatía



SPCD comunes: delirios

Hallazgo común
Prevalencia: 16-70%



Ideas delirantes de robo



Infidelidad




Delirios de falso reconocimiento

SPCD comunes: depresión

Tasa de síntomas
depresivos: 30-50%

SPCD comunes: depresión



. Pearlson GD, Ross CA, Lohr WD, et al. Association between family history of affective disorder and the depressive syndrome of Alzheimer's disease. *Am J Psychiatry*. 1990;37:452–456.



Síntomas comunes de SPCD

Desinhibición:

- Ocurre en aproximadamente un tercio de los individuos con demencia

Alucinaciones visuales

- Forma más común de alucinación

Irritabilidad y labilidad del estado de ánimo

- Más prevalente con la progresión de la demencia