

Copyright Instituto de Psicofarmacología

Esta presentación está protegida por derechos de autor por el Instituto de Psicofarmacología.

Los suscriptores pueden descargarla y utilizarla sólo para uso personal.

La distribución de esta presentación y su contenido, sin permiso, es una violación a los derechos de autor.



Evaluación de los SPCD

Rajesh Tampi , MD

Professor of Psychiatry

Case Western Reserve University School of Medicine



Obtención de información adicional importante



Información adicional de
cuidadores y/o miembros de la
familia

Obtención de información adicional importante



Información adicional de
cuidadores y/o miembros de la
familia

Inicio

Curso

Diagnóstico
diferencial

Riesgo y
pronóstico

Obtención de información adicional importante




Información adicional de
cuidadores y/o miembros de la
familia

Disparadores
ambientales

Estresores
psicosociales

Descartar causas médicas



Síndromes de
dolor




Deshidratación



Infecciones del tracto
urinario

Descartar causas médicas



Síndromes de dolor



Deshidratación



Infecciones del tracto urinario

Evaluación y manejo eficaces

Reducción de la frecuencia y gravedad de los SPCD

Uso de evaluaciones estandarizadas



Se usan para:

- Evaluar la gravedad
- Seguimiento de la progresión de los SPCD en el tiempo
- Seguimiento de la respuesta al tratamiento

Uso de evaluaciones estandarizadas



Ejemplos

- NPI: Inventario Neuropsiquiátrico
- BEHAVE-AD: Escala de Medición de la Patología Conductual en la Enfermedad de Alzheimer
- CERAD-BRSD: Consorcio para Establecer un Registro para EA- Escala Conductual de la Demencia
- DBSS: Escala de Alteraciones Conductuales de la Demencia

Uso de evaluaciones estandarizadas



Ejemplos

- NPI: Inventario Neuropsiquiátrico
(La herramienta de evaluación más popular y confiable)